

التطعيم الروتيني

ماذا يمكنني ان افعل بعد الحملة للمساعدة في وقف انتشار الامراض بين الأطفال في منطقتي؟

تأكد من حصول جميع أطفالك على التطعيمات الروتينية. يحمي التطعيم الأطفال من الأمراض القاتلة في مرحلة الطفولة، مثل شلل الأطفال والحصبة والكزاز والدفتيريا والنكاف والحصبة الألمانية والتهاب الكبد البائي والسل وغيرها.

• الالتزام ببرنامح التطعيم الوطني يضمن حصول الأطفال على الحماية الكاملة.

تخضع جميع اللقاحات لاختبارات صارمة لضمان سلامتها وفعاليتها

تحقق من سجل التطعيم الموجود في كتيب صحة الأم والطفل لتتأكد من حصول طفلك على جميع التطعيمات. إذا كان لديك استفسارات، قم بزيارة أقرب نقطة طبية للحصول على المشورة.

"لا تؤخر التطعيم، فكل جرعة ضرورية لصحة طفلك!"

يمكننا ايضا الانتباه والإبلاغ عن حالات الشلل الرخو الحاد المشتبه فيها: إذا ظهرت على الطفل أعراض شلل مفاجئ أو ضعف في الأطراف (خاصة بعد الإسهال)، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بشلل الأطفال أو أمراض أخرى وينبغي التوجه في هذه الحالات على الفور إلى أقرب مستشفى.

س10. بالإضافة إلى التطعيم، ما الذي يمكنني فعله للحد من انتشار شلل الأطفال والأمراض الأخرى؟

ج 10: ممارسة الإجراءات الصحية التالية:

معالجة مياه الشرب

قم بغلي الماء حتى يتصاعد منه البخار لتعقيم الماء ثم اترك الماء ليبرد ويمكن ايضا تعقيم المياه من خلال اضافة اقراص الكلور الخاصة بمعالجة المياه اذا توفرت واتباع الارشادات بخصوص الكمية المحددة.

[يجب تصفية الماء العكرة قبل تعقيمها للشرب]

غسل اليدين

• اغسل يديك بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.
• في حالة عدم توفر الصابون، استخدم الرماد الابيض أو معقم اليدين الذي يحتوي على 60% كحول على الأقل
• اغسل يديك خاصة قبل تناول الطعام أو إعدادة وبعد استخدام المرحاض أو لمس الأسطح الملوثة.
• استخدم المياه النظيفة لغسل الأطباق، وتنظيف أسنانك، وإعداد الطعام.
• اغسل الفواكه والخضروات إن وجدت بالماء النظيف قبل تناولها.

اغلق حفر المراحيض

اغلق حفر المراحيض بشكل امن والحفاظ على نظافتها يحد من انتشار الامراض.

س 11 : ماذا لو كان لدي المزيد من الأسئلة أو المخاوف حول تطعيم شلل الأطفال؟

ج 11: يمكنك التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية، العاملين الصحيين المجتمعيين أو وزارة الصحة. يمكنهم تزويدك بمعلومات موثوقة ومعالجة أي مخاوف قد تكون لديك.

هل لديكم أي استفسارات أو شكاوي ؟

إن الحصول على المساعدات والخدمات الإنسانية من دون مقابل أو استغلال هو حق مكفول، إذا كان لديكم أي استفسارات أو شكاوي، نرحب بتواصلكم عبر القنوات التالية:

للملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالتطعيم:

مثل موعد أو مكان التطعيم، أو كيفية حصول أطفالكم على التطعيم، أو في حال كانت لديكم أي شكاوي أو تعليقات، يمكنكم الاتصال بسرية على الرقم المجاني (124-126-1800) من 8 صباحاً إلى 8 مساءً.

للإبلاغ عن أي تجاوزات:

في حال تعرضكم أو مشاهدتكم لأي نوع من الإساءة أو المعاملة غير اللائقة أثناء تقديم الخدمات، يمكنكم الاتصال بسرية على الرقم المجاني لمؤسسة سوا 164

لمزيد من المعلومات:

من جوال:



من أوريدو:



عبر الإنترنت:



حملة التطعيم
ضد مرض شلل الأطفال
في قطاع غزة

أسئلة وأجوبة عن مرض شلل الأطفال (الجرعات الإضافية)




أسئلة وأجوبة عن مرض شلل الأطفال

الأهالي الأعزاء،

سيكون هناك جولتان إضافيتان من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حيث لا يزال فيروس شلل الأطفال منتشر في البيئة، وتبين ذلك بعد فحص عينات جديدة من المياه العادمة في قطاع غزة.

هذه الحملة تستهدف جميع الأطفال سن 10 سنوات أو أقل حتى لو تم تطعيمهم مسبقاً. **الجرعات الإضافية تعزز المناعة وتحمي الأطفال من الإصابة.** كما هو الحال في الجولات السابقة، سيتم إعطاء كل طفل سن العشر سنوات أو أقل جرعتين من اللقاح على مرحلتين مختلفتين يفصلهما أربعة أسابيع وسيتم إعطاء النوع الفموي من هذا اللقاح بواقع نقطتين بالفم كل مرة.

مع العلم ان شلل الأطفال هو مرض معد جداً يسببه فيروس بشري يغزو الجهاز العصبي وتتراوح شدته من عدوى بسيطة إلى مرض يصعبه شلل رخوي في الأطراف، خصوصاً السفلى من الجسم. كل جرعة تعزز مناعة الأطفال وتساعد في الحد من انتشار المرض.



س1: لماذا لا يزال مرض شلل الأطفال موجود في قطاع غزة بعد جولتين من الحملة؟

ج1. عدة اسباب محتملة قد تؤدي الى استمرار انتشار فيروس شلل الأطفال في البيئة مثل:

- الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيم خلال الحملة السابقة بسبب ظروف الحرب.
- التلوث بسبب وضع الصرف الصحي وسوء التغذية.

ليس من المستبعد أن يستمر انتشار فيروس شلل الأطفال في البيئة بعد جولتين من التطعيم في ظل إنهمار البنية التحتية للصرف الصحي ونقص الموارد اللازمة للحفاظ على النظافة الشخصية والعامة وظروف النزوح الجماعي والاكتظاظ بسبب الحرب.

مع العلم ان بلدان أخرى واجهت مواقف مماثلة من سوء الصرف الصحي وسوء التغذية ومع إجراء جولات إضافية من التطعيم تم القضاء على فيروس شلل الأطفال بنجاح.

س 2: كيف ينتقل مرض شلل الأطفال؟

ج 2: ينتقل مرض شلل الأطفال من شخص مصاب إلى آخر سليم عبر عدة طرق منها البراز الملوث أو طعام وماء ملوثين أو استخدام أدوات ملوثة بالفيروس. يدخل الفيروس الجسم عبر الفم ثم يتكاثر في الحلق والأمعاء وينتقل عبر الدم إلى باقي أجزاء الجسم وفي العادة تكون فترة حضانة الفايروس في المتوسط من أسبوع - إلى أسبوعين وقد تمتد ما بين 30-35 يوم

س 3: لقد حصل جميع أطفالنا على التطعيم سابقاً، هل يجب علي أن أعطيهم التطعيم مرة أخرى؟

ج 3 : نعم، الجرعات الاضافية تعزز المناعة حيث تبين وجود فيروس شلل الأطفال في عينات بيئية جديدة من المياه العادمة في قطاع غزة مما يعني أن خطر الانتشار والإصابة بين الأطفال لا يزال موجوداً.

س 4: ما هي مخاطر الإصابة بمرض شلل الأطفال؟

ج 4: تؤدي حالة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادة) ويلاقي ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظيفتها.

س 5: هل هناك علاج لمرض شلل الأطفال وكيف يمكننا حماية أطفالنا من هذا المرض؟

ج 5: لا يوجد علاج في حال الإصابة بالمرض. التطعيم هو الحل الوحيد والفعال للوقاية من شلل الأطفال.

س 6: هل لقاح شلل الأطفال آمن لطفلي؟

ج 6: نعم، لقاح شلل الأطفال آمن وتم استخدامه في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، بما في ذلك الأطفال المرضى وحديثي الولادة. يظل لقاح شلل الأطفال هو الوسيلة الأفضل والأكثر أماناً وفعالية لتحصين الطفل ضد شلل الأطفال.

س 7 : هل هناك أي آثار جانبية للقاح شلل الأطفال؟

ج 7 : لقاح شلل الأطفال آمن جداً. معظم الأطفال لا يعانون من أي آثار جانبية. إذا حدثت آثار جانبية، فإنها عادة ما تكون خفيفة.

س 8 : ماذا سيحدث اذا لم يتم تطعيم جميع الأطفال خلال الحملات؟

ج 8: اذا لم يتم تطعيم كل طفل خلال الحملات الوطنية، فإن فيروس شلل الأطفال سيستمر بالانتشار بشكل أسرع ويصيب المزيد من الأطفال. حيث أن طفلاً واحداً غير محصن من المرض، قد يعرض بقية الأطفال للخطر ويهدد صحتهم ومستقبلهم، لذا دعونا نحمي جميع الأطفال من خلال تطعيم كل طفل.

س 9 : هل يمكن للبالغين الإصابة بمرض شلل الأطفال؟

ج 9 : بينما يؤثر شلل الأطفال بشكل رئيسي على الأطفال دون سن الخامسة، يمكن للبالغين أيضاً الإصابة بالعدوى اذا لم يكونو قد تلقوا اللقاح ضد مرض شلل الأطفال مسبقاً. يساعد التطعيم في منع انتشار الفيروس إلى جميع الفئات العمرية.